Lerasept® VET 100

Formaldehydhaltiges Stalldesinfektionsmittel mit drei Wirkstoffen und MG-Aktivator

Lerasept® VET 100 ist ein hochkonzentriertes flüssiges Breitband-Flächendesinfektionsmittel mit oberflächenaktiven Wirkstoffen und hervorragender mikrobiozider Wirkung. Es wird sowohl für die Routine als auch zur speziellen Desinfektion von Tierställen, Stalleinrichtungen und Gerätschaften sowie für Transportfahrzeuge eingesetzt. Lerasept® VET 100 ist wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren. Das Produkt wird zur Bodenreinigung und -desinfektion in tierärztlichen Einrichtungen und Kliniken verwendet.

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für in der Landwirtschaft übliche Metall- und Kunststoffoberflächen.
Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

Lerasept® VET 100 wird zur allgemeinen und speziellen Desinfektion im Veterinärbereich verwendet (PT3).
Es ist mit Sprühlanzen, Sprühanlagen, Handspritzen oder auch Schaumgeräten einsetzbar. Die zu behandelnden Flächen müssen gut gereinigt und möglichst trocken sein.
Einsatzmenge: 400 ml/m^2

Lerasept® VET 100 wird auch zur Desinfektion von harten Oberflächen, Böden und Wänden in tierärztlichen Einrichtungen (PT2) verwendet.
Die Aufbringung erfolgt mittels Wischmopp.

Gutachten nach DIN EN 1656, 1657, 14675, 16437, 14349, 13727, 17387, 13624 und DVG-Richtlinien liegen vor.

Für industriellen und professionellen Gebrauch.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung

Deutschland	BAuA: N-102197
Österreich	registriert
Polen	8203/20
Serbien	532-01-3193/2021-03
Slowakei	bio/3843/D/21/CCHLP

Wichtige Inhaltsstoffe

Formaldehyd (153 g/kg), Glutaral (210 g/kg), Benzyl(C12-16)-alkyl-dimethylammoniumchlorid (20 g/kg), Tenside, Stabilisatoren

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides
biocides@stockmeier.com
+49 521 / 3037- 0



Kategorie

- Biozid

pH-Wert

- Sauer

Aktivsubstanz

- Formaldehyd
- Glutaral
- QAV

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid

Aggregatzustand

- Flüssigkeit

Konformität

- IHO
- DVG

Zertifizierungen

- Halal

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com

Lerasept® VET 100

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	klare Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,07 - 1,13 g/cm³
pH-Wert	3,0 - 4,0

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.
Evtl. zu viel entnommenes Produkt darf niemals in das Originalgebinde zurückgefüllt werden.

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhält.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
Hinweise für den Arzt: Behandlung entsprechend den Symptomen empfohlen.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
Desinfektion von Oberflächen durch Sprühen (PT3)				
Bakterien, spezielle Desinfektion	10°C	120 Min.	gering	1,5% Produkt ≙ 150 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Bakterien, vorbeugende Desinfektion	10°C	60 Min.	gering	0,75% Produkt ≙ 75 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Viren behüllt	10°C	120 Min.	hoch	1,5% Produkt ≙ 150 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Viren unbehüllt	10°C	120 Min.	hoch	2,5% Produkt ≙ 250 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Hefen	10°C	30 Min.	gering	0,5% Produkt ≙ 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Oberflächendesinfektion mittels Wischmopp (PT2)				
Bakterien	20°C	30 Min.	hoch	0,5% Produkt ≙ 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Hefen	20°C	30 Min.	hoch	0,75% Produkt ≙ 75 ml auf 10 l Wasser verdünnen

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com